



แพทย์ผิวหนังเตือน เห็บกัดคน มีอันตราย



กรมการแพทย์
สถาบันโรคผิวหนัง



สถาบันโรคผิวหนัง
INSTITUTE OF DERMATOLOGY

สถาบันโรคผิวหนัง เตือนเห็บกัดคนเป็นอันตราย ส่วนใหญ่เห็บอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยง
เช่น สุนัขหรือแมว ซึ่งใกล้ชิดกับคน คนจึงมีโอกาสถูกเห็บกัด
และเห็บยังเป็นพาหะนำโรคติดต่ออีกหลายชนิด

แหล่งที่อยู่



ต้นหญ้าสูงๆ



สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข,แมว

อาการ



ผู้ที่ถูกเห็บกัดมักไม่มีอาการเจ็บ
เนื่องจากในน้ำลายของเห็บประกอบ
ด้วยสารที่ทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่
ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าถูกกัด



เห็บบางบริเวณที่ถูกกัด
พบเป็นตุ่มบวมแดง



ในบางรายที่เกิดอาการแพ้
อาจพบว่า มีไข้หรือ
ผื่นคันชนิดลมพิษ



อาการที่เกิดจาก
เห็บกัดมักเป็นเพียง
อาการเฉพาะที่



ผู้ป่วยส่วนน้อยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหลังถูกเห็บบางชนิดกัด
คือ การเกิดอัมพาตจากการถูกเห็บกัด เริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัว
ปวดเมื่อยตามตัว จากนั้นในระยะเวลาไม่นานจะเกิดเป็นอัมพาต ซึ่งภาวะนี้อาจนำไปสู่ภาวะระบบหายใจล้มเหลว
ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อาการเป็นอัมพาตจากการถูกเห็บกัดนี้ มักเกิดภายในระยะเวลา 4-6 วันหลังโดนกัด
ภาวะนี้จะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อรีบเอาเห็บออกจากผิวหนังของผู้ป่วย



การรักษา



หลังจากเอาตัวเห็บออกไปได้แล้วสามารถรักษาอาการ
ผิวหนังบวมแดงได้ด้วยยาทาลดการอักเสบ

ในบางรายที่บวมแดงมาก
แพทย์อาจพิจารณาใช้การฉีดยาได้เพื่อลดอาการ

การนำเห็บออกจากผิวหนัง



1

ทำได้โดยจับเอาเห็บออกโดยใช้แหนบจับที่ส่วนหัวของเห็บ
แล้วค่อยดึงขึ้นตรงๆอย่างนุ่มนวล



2

ระวังอย่าจับบริเวณลำตัวหรือท้องของเห็บ



3

อย่าบีบคั้นขณะที่กำลังจับเพราะจะทำให้ส่วนปากของเห็บยังคงค้างอยู่ในผิวหนัง
ทำให้เกิดเป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่แบบเรื้อรังตามมาได้

