

โรคภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือโรคเห็บ “Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)”

เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ โดยเห็บสายพันธุ์ *Haemaphysalis longicornis* เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ นอกจากนี้เห็บสายพันธุ์ *Rhipicephalus microplus*, *Amblyomma testudinarium*, *Ixodes nipponensis* ยังสามารถเป็นพาหะนำโรคได้ มักพบในสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย แพะ แกะ สุนัข แมว หนู หมู ไก่ และนก เมื่อคนถูกเห็บที่มีเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำ (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus; SFTSV) กัด จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะภายใน 7-14 วัน ส่วนใหญ่มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว [4-16] บางรายอาจพบความผิดปกติทางระบบประสาท ได้แก่ ชัก ชี้นิ่งร่วมด้วย หลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ตับอักเสบและการทำงานของอวัยวะภายใน ล้มเหลวก่อความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาได้ทันเวลาที่ เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมผู้ป่วยจะมีอาการจะดีขึ้นตามลำดับ



โรคภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือโรคเห็บ

Severe Fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Severe Fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) มีเห็บเป็นพาหะนำโรคหลัก และมีโอกาสแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดย “การสัมผัสผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสในเลือดสูง”



อาการ



มีไข้



เบื่ออาหาร



ต่อน้ำเหลืองโต



มีรอยเลือดออกใต้ผิวหนัง



เกล็ดเลือดต่ำ

อาจเกิดภาวะที่อวัยวะภายในล้มเหลวและรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต

พื้นที่เสี่ยง



บริเวณป่า พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ราบสูง ที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ

กลุ่มเสี่ยง



- เกษตรกร
- ผู้มีอาชีพหาของป่า
- นักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

การป้องกัน



- ใช้สารทากันแมลง
- ใช้สเปรย์กำจัดแมลง
- สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด



กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง

29 มีนาคม 2567